


# SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ NEDİR?

Servikteki hücreler anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladığında serviks kanseri oluşmaktadır.

Serviks kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Pap-Smear testiyle tarama sayesinde erken tanı ve etkin bir tedavi mümkündür. Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerin önde gelen 3. nedenidir. Dünya çapında 2 dakikada bir, bir kadın serviks kanserinden ölmektedir. Tarama programları, serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar serviks kanseri nedeniyle ölmektedir.

## İSTANBULONKOLOJİ HASTANESİ



Cevizli Mahallesi Talatpaşa Caddesi B Blok

No:75 Maltepe / İSTANBUL

[www.istanbulonkoloji.com](http://www.istanbulonkoloji.com)



Çağrı Merkezi (216)  
**4573737**



BM-834 / YAY.TAR.27.09.2022/REV.NO:0

# SERVİKS KANSERİ



## İSTANBULONKOLOJİ HASTANESİ

*Başarımız Sağlığınız...*

## Serviks (Rahim Ağız) Kanseri:

Öncü lezyonların tespiti ile önlenir. Erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Anormal kanama ve kanlı, kokulu, kaşıntısız akıntınız varsa hemen doktorunuza başvurun. Serviks kanserinde öncü lezyonlar sıklıkla 20-30 yaşlarında görülür. Serviks kanseri ise öncü lezyonlardan uzun bir latent periyod sonrası görülür. Serviks kanseri görülme yaş ortalaması 40'dır.


## Risk Faktörleri

- Human Papilloma Virüs (HPV)  
Serviks kanseri öncü lezyonlarında ve serviks kanserlerinde en önemli risk faktörüdür. Tüm serviks kanseri öncü lezyonlarında %80 serviks kanserlerinde %97 oranında HPV mevcuttur.
- Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları geçirmiş olmak
- Sigara tüketmek

## Tanı

- Smear
- Kolposkopi
- Biyopsi
- Radyolojik inceleme

Hastalığın yayılımını değerlendirmek amacıyla akciğer grafisi, intravenöz pyelografi, tomografi, MR, PET kullanılabilir.



## Serviks Kanserinde Tarama Nasıl Yapılır?

Serviks kanserinde tarama Smear testi ile yapılır. Ağrısız ve kısa süreli bir uygulamadır. Muayene sırasında hekim küçük bir fırça ya da alet vasıtası ile rahim ağzından sürüntü örneği alır. Bu hücreler laboratuvara gönderilir ve anormal hücreler yönünden patoloğ tarafından incelenir. Böylece anormal hücreler erken evrede saptanır ve kansere dönüşmeden tedavi edilmeleri sağlanır. Kanser oluştuğundan sonra bu tedavi daha zorlu ve maliyetlidir.



## Belirtiler

- Öncü lezyonlarda belirgin bir klinik bulgu olmaz. Serviks kanserinde ise anormal kanama ve kanlı kokulu, kaşıntısız akıntı sık görülür. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak kasık ağrısı, kilo kaybı, kansızlık (anemi) ortaya çıkar.

## Serviks Kanseri Nasıl Önlenir?

Serviks kanserinde %97 oranında HPV'ye rastlanmıştır. HPV, serviks kanserinin esas sebebi olarak görülmektedir. Aşılamaya ile rahim ağzı kanserinin çok önemli bir kısmı engellenebilir. Bu nedenle doktorunuza başvurarak aşılanmanızı yaptırmanız çok önemlidir.

## Serviks Kanserinde Tarama Neden Önemlidir?

Tarama yöntemleri ile serviks kanseri önlenir, erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalık olmuştur. Tarama testleri ile serviks (rahim ağzı) kanseri ölümcül kanserler sıralamasında başlardaki yerini kaybetmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen ikinci kanserken, gelişmiş ülkelerde en sık görülen 5-6. Kanserdir.



Çağrı Merkezi (216)  
4573737

## Kimlerde Tarama Yapılmalıdır?

20-65 yaş arasındaki bütün kadınlar bu taramayı yaptırmalıdır. Başlangıçta bu işlem yılda bir kez yapılır, ancak iki kez üst üste normal sonuçlanan Smear testiniz varsa tarama aralığı daha seyrekleşerek iki yılda bir olabilir. Düzenli uygulanan Smear testi kanserden en iyi korunma yöntemidir.